

# КАРАКУЛЬ

Авторы: Г. Ф. Есина

КАРАКУЛЬ (тюрк. – чёрное озеро; от названия оазиса Каракуль на р. Зеравшан, в Узбекистане), шкурки ягнят каракульской породы, забитых или павших в возрасте 1–3 сут. Шкурки перерослых (до 1 мес) каракульских ягнят называются яхобаб; имеют более крупный, чем у К., волосяной покров.




Рис. 1. Виды каракуля: узбекский (а), афганский (б) и намибийский (в).

Отличит. особенность К. – завитки волосяного покрова, образующие рисунок шкурки. Осн. признаки качества К. – форма и размер завитков, а также их разл. сочетания. Высоко ценится К. с завитками в виде валька, боба или узкой гривки, менее – с завитками в виде горошка, кольца, штопора, улитки и др. Помимо наличия ценных завитков и значит. степени их распространения по площади шкурки имеют

значение и др. признаки (которые определяются органолептически): густота, шелковистость, блеск, плотность завитков, чёткость рисунка. В результате селекции каракульской породы овец созданы три осн. вида К. – узбекский, афганский, намибийский, или «свакара» (аббревиатура от South-West Africa Karakul), различающиеся формой завитков, их высотой и узором (рис. 1). Узбекский К. имеет характерный рисунок, который создают тугие завитки, образующие трубчатые вальки разной длины по всей площади шкурки; афганский К. – более плоские завитки; намибийский К. – ребристый рисунок из чётко выраженных низких тугих и длинных параллельных вальков. К. присуще цветовое разнообразие (рис. 2). Наиболее распространённый цвет К. – чёрный. У серого К. волосяной покров образован сочетанием чёрных и белых волос, в зависимости от их соотношения цветá серого К. изменяются от светло-голубого до почти чёрного. Цветной К. бывает следующих

окрасов: сур, однотонный коричневый, однотонный др. расцветок и пёстрый. К. сур может иметь разные оттенки: золотистый, бронзовый, серебристый, платиновый, янтарный и др. Интенсивность окраски сур меняется по длине волоса – более тёмное основание и более светлый кончик. Однотонный коричневый К. имеет волосяной покров разл. оттенков – от тёмно- до светло-коричневого. Другие расцветки (от коричневого до фиолетового и розового) волосяного покрова К. обусловлены разл. соотношением коричневых и белых волос. Пёстрый К. имеет волосяной покров с пежинами (пятнами, отличающимися от осн. цвета шкурки). Белый К. самый редкий.




Рис. 2. Цветовое разнообразие каракуля.

Снятые пластом шкурки с каракульских ягнят консервируют, выделывают и для улучшения качества обрабатывают, применяя крашение, тонирование, отбеливание, двустороннюю отделку (по волосу и по кожной ткани) и глажение по волосяному покрову, если он образован менее ценными завитками. Из каракулевых шкур изготовливают меховые изделия – манто, пальто, жакеты, костюмы, головные уборы и др.

## Литература

Лит.: Соколов В. Е., Петрищев Б. И. Кожный покров домашних млекопитающих (копытные). М., 1997; Беседин А. Н., Каспарьянц С. А., Игнатенко В. Б. Товароведение и экспертиза меховых товаров. М., 2007.