

КЕДРОВЫЙ СТЛАНИК

Авторы: С. А. Баландин



Кедровый стланик.

Фото К. Е. Михайлова

КЕДРОВЫЙ СТЛАНИК (*Pinus pumila*), вечнозелёное, сильно ветвистое стелющееся или приподнимающееся деревце (выс. до 3–7 м) из группы [кедровая сосна](#). Хвоя трёхгранная (длина 4–7 см), мелкозубчатая по краю, живёт 2–4 года. Шишки яйцевидные или удлинённые (длина 3,5–4,5 см), светло-бурые, блестящие. Ареал К. с. охватывает Вост. Сибирь, Дальний Восток, высокогорья Корейского п-ова, Японии и едва заходит в горы Сев. Монголии и Китая (Хинган).

Растёт обычно густыми зарослями, а также в подлеске лиственничных лесов и редколесьях на выс. 600–2000 м. Выдерживает экстремальные условия внешней среды, в т. ч. низкие темп-ры, многолетнюю мерзлоту, сильные ветры; произрастает на бедных минер. элементами песках, торфяниках, щебнистых и каменистых почвах. Обладает способностью образовывать придаточные корни на лежащих стволиках, в связи с чем представляет интерес как укрепитель песков, каменистых горных склонов. Ветви и стволы могут полежать под тяжестью снега на поверхность почвы с наступлением холодов и восстанавливать своё положение при потеплении. В сев.-вост. Азии образует северную, а в горных системах – верхнюю границу древесной растительности. Древесина, как и хвоя, идёт на топливо, для получения скипидара, эфирных масел. Водный настой, отвар или экстракт хвои – противочинготное средство. Съедобные семена (длина 5–8 мм) по вкусовым и полезным свойствам не уступают семенам др. кедровых сосен; их урожай – до 200 кг/га. Как декоративное растение разводят в садах и парках. В зарослях К. с. обитают мн. виды животных: кедровки, белки, горностаи, соболи, бурые медведи и др.

