



# ГЕЙДЕЛЬБЕРГСКИЙ ЧЕЛОВЕК

Авторы: А. А. Зубов

---

ГЕЙДЕЛЬБЕРГСКИЙ ЧЕЛОВЕК (*Homo heidelbergensis*), ископаемый вид рода *Homo*. Назван по находке нем. исследователем О. Шётензаком в 1907 массивной челюсти у дер. Мауэр, близ Гейдельберга. Для Г. ч. характерна высокая степень внутривидовой изменчивости и контрастное (мозаичное) сочетание архаических (эректоидных) и прогрессивных (сапиентных) признаков при слабой выраженности неандерталоидного комплекса: объём черепа (в ср. 1100–1200 см<sup>3</sup>) меньший, но высота свода бóльшая, чем у неандертальца; очень толстые кости свода, массивный затылочный торус (гребень) – архаичные черты; округлая, «сапиентная», общая форма затылка; выраженный перегиб основания черепа (сапиентный признак, связываемый с речевой функцией) и др. Видовое единство *таксона* Г. ч. признаётся не всеми антропологами. Появление Г. ч., по-видимому, произошло в Африке ок. 900 тыс. лет назад (древнейшая находка – череп из Бодо, Эфиопия, 600 тыс. лет назад), где ему предшествовал вид *Homo ergaster*. К Г. ч. можно отнести т. н. ранних архаичных сапиенсов в Африке (Рабат, Марокко, 250 тыс. лет назад; Салданыя, ЮАР, 200 тыс. лет назад; *Кабве*, Замбия, 120 тыс. лет назад; Эясси-1, Эфиопия, 36 тыс. лет назад, и др.) и Передней Азии (*Мугарет-эль-Зуттие*, Израиль, 350–250 тыс. лет назад), находки на Кавказе (*Азых*, Азербайджан, 150–100 тыс. лет назад), в Индии (Хатнор, штат Мадхья-Прадеш), Китае (Юнсян, 350 тыс. лет назад; *Цзиньнюшань*, от 300 до 200 тыс. лет назад; *Дали*, от 200 до 100 тыс. лет назад; Чаосян, 200–160 тыс. лет назад) и Индонезии (*Нгандонг* на о. Ява, от 100 тыс. лет назад). По-видимому, Г. ч. – первый человек, ставший жить за пределами тропич. пояса. В Европе Г. ч. появился, вероятно, ок. 800 тыс. лет назад, переселившись из Сев. Африки через Гибралтарский прол. или через о. Сицилия (как его ранних представителей можно рассматривать находки из *Атапуэрки*, *Чепрано*). Характерные для Г. ч. признаки отмечены у людей, живших в Зап. и Центр. Европе в миндель-рисский период, 450–

300 тыс. лет назад ([Араго](#), [Петралона](#), [Фонтешевад](#), [Штейнгейм](#), [Сванскомб](#), [Вертешсёлеш](#) и др.), которых ранее иногда определяли как прямых предков [Homo sapiens](#) (т. н. пресapiенсов) или [неандертальцев](#) (т. н. пренеандертальцев, генерализованных неандертальцев); останки Г. ч. часто сопровождаются ашельской каменной индустрией. Поздними представителями Г. ч. в Европе можно считать т. н. атипичных неандертальцев ([Эрингсдорф](#), [Саккопасторе](#), Гибралтар, Абри-Сюар, Гановце), находки которых датируются концом рисса и рисс-вюрмским межледниковьем (140–75 тыс. лет назад) и сопровождаются мустьерской индустрией; в дальнейшем эта форма, по-видимому, эволюционировала в «классических» неандертальцев. См. также [Антропогенез](#).

## Литература

Лит.: Зубов А. А. Новая интерпретация роли «гейдельбергского человека» в эволюции рода Homo // Этнографическое обозрение. 2001. № 1.