

СУСЛИКИ

Авторы: Н. А. Щипанов



Фото Ю. Данилевского

Жёлтый суслик (*Spermophilus fulvus*).

СУСЛИКИ (*Spermophilus*), род млекопитающих сем. беличьих. Длина тела 11–40 см, хвоста 4–25 см. Уши короткие, слабо опушённые. Имеются защёчные мешки. Задние конечности несколько длиннее передних. Окраска спины обычно желтовато-серая, брюхо светлее. До 38 видов; в России 9 видов. Распространены в Сев. Америке и Евразии, в равнинных и горных (на выс. до 3000 м) степях и лесостепях, частично в тундре и лесотундре. По поймам рек заходят в полупустыни и пустыни. Активны в

светлое время суток. Убежища находят в норах, которые роют сами, часто селятся колониями. На песчаных почвах длина норы может достигать 20 м, глубина до 3 м. Питаются разнообразной растит. пищей, мн. виды включают в рацион животные корма, в осн. насекомых. Могут делать запасы пищи (до 6 кг). На зиму впадают в спячку (6–7 мес, на севере до 10 мес). Один помёт в год, 2–13 детёнышей. Половая зрелость обычно на 2-м году жизни. С. – важный элемент природных экосистем, в осн. благодаря их роющей деятельности. При высокой численности могут наносить существенный урон с.-х. культурам. Многие С. – природные носители возбудителей ряда болезней, в т. ч. чумы. Крупные С. – объекты второстепенного пушного промысла. Согласно Красному списку МСОП, 3 узкоареальных вида на юге и юго-западе Сев. Америки находятся под угрозой исчезновения, состояние ещё 5 видов вызывает тревогу.