

# ТОЛСТОЛОБИКИ

Авторы: Ю. С. Решетников



Белый толстолобик.

ТОЛСТОЛОБИКИ (*Hypophthalmichthinae*), подсемейство пресноводных рыб сем. карповых. 2 рода, 2 вида, в реках Вост. и Юго-Вост. Азии; в России в бассейне Амура. У белого Т. (*Hypophthalmichthys molitrix*) длина тела обычно до 1 м, масса до 16 кг; на брюхе киль, идущий от горла, сращённые жаберные перепонки

образуют цедильный аппарат. Пёстрый Т. (*Aristichthys nobilis*; естеств. ареал – реки Центр. и Юж. Китая) крупнее белого (длина тела обычно до 140 см, масса до 32 кг), окраска более тёмная, по бокам у взрослых рыб выделяются пятна. Киль расположен от брюшных плавников до анального отверстия. Половой зрелости Т. достигают в 5–7 лет. Нерест летом, во время паводка. Плодовитость 490–540 тыс. икринок. Икра пелагическая. Молодь питается зоопланктоном, взрослые особи белого Т. переходят на фитопланктон, пёстрого – на смешанное питание. Образуют межвидовые гибриды. Акклиматизированы во многих странах. Объект промысла и прудового разведения.